



Medikamenteneinnahme und allergologische Diagnostik mittels Prick-Test

Bei einem Hauttest (sog. **Prick-Test**) müssen unbedingt folgende Medikamente vor dem Test für die genannten Zeiträume pausiert werden:

- oral verabreichte **Antihistaminika** (H1-Blocker) **1. Gen.** (Dimetinden (Fenistil), Dimenhydrinat (Vomex), Clemastin, Diphenhydramin (Emesan), Doxylamin, Hydroxyzin, Promethazin): **3 Tage**; Ketotifen: **5 Tage**
- oral verabreichte **Antihistaminika** (H1-Blocker) **2. Gen.** (Cetirizin, Levocetirizin, Loratadin, Desloratadin, Ebastin, Mizolastin, Fexofanadin, Rupatadin, Bilastin): **7 Tage**
- lokal auf die Unterarme aufgetragene **Kortisoncremes** (Methylprednisolon (Advantan), Hydrocortison (Alfason 0,1 Creme), Momethason, Prednicarbat, ...):
7 Tage
- lokal aufgetragene **Crems** mit den Inhaltsstoffen Tacrolimus und Pimecrolimus:
7 Tage
- auch für folgende Medikamente sind Pausenzeiten notwendig, diese müssen wir aber aufgrund der Komplexität der Fälle individuell mit euch besprechen: Omalizumab und andere humane Antikörpertherapien, eingenommene Steroide sowie Psychopharmaka (Promethazin, tricyclische Antidepressiva).

Solltet ihr euch unsicher sein, ob ihr eure Medikamente weiter einnehmen solltet, ruft uns bitte in der Praxis an!

Wenn es aufgrund der Schwere eurer Allergie nicht möglich ist, die Medikamente zu pausieren, sprecht uns bitte an, dann finden wir ganz sicher eine Lösung für euch.

Wir freuen uns, dass ihr zur Allergietestung zu uns kommen möchtet und damit den nächsten Schritt hin zu einer sicheren Diagnose und ggf. Therapie geht!

Alles Gute wünscht euer Team der Kinder- und Jugendarztpraxis Lobstein!